

2022년 5월-10월 기후 전망

발표일: 2022년 4월 15일

평년보다 높은 유라시아, 아프리카 북부·중부, 아르헨티나 남부의 기온, 평년보다 많은 동인도양과 호주의 강수

- 향후 3개월-5개월 사이의 ENSO 경보는 “라니냐 주의(La Niña WATCH)” 를 전망함. 최근 열대 중앙 및 동태평양 해수면온도가 평년보다 다소 낮았으며, 2022년 5월-10월 동안 Niño3.4 지수는 -0.7°C 이하에서 서서히 증가하여 약 -0.3°C 의 Niño3.4 지수가 지속될 것으로 전망됨. 2022년 5월-7월 동안 약 51%의 확률로 라니냐 상태가 나타날 것으로 전망되나 그 강도는 약할 것으로 보임. 그 후 라니냐 확률은 감소하고 ENSO 중립 상태가 나타날 확률은 서서히 증가하여 2022년 8월-10월까지 52% 이상의 확률로 중립 상태가 우세할 것으로 예상됨.
- 2022년 5월-10월 동안 유라시아(인도 및 인도차이나반도 제외), 아프리카 북부 및 중부, 아르헨티나 남부의 기온은 평년보다 높을 확률이 다소 클 것으로 전망됨.
- 같은 기간 동안 인도와 동인도양과 호주의 강수는 평년보다 많을 확률이 다소 클 것으로 예상됨.





그림 1. 2022년 5월-7월 기온(위)과 강수(아래)의 확률예측 및 과거검증.

* 2022년 8월-10월 정보는 <http://www.apcc21.org/ser/global/outlookSummary.do?lang=ko>에서 확인할 수 있습니다.

최근 기후 현황

- 2022년 3월에는 적도 중앙 및 동태평양에 평년보다 낮은 해수면 온도가 나타났음. 날짜 변경선 부근의 대류 활동이 다소 억제되었으며 적도 태평양 전반에 동풍 편차가 나타났음(그림 2, 3).
- 2022년 3월에는 북극의 기온이 5°C 이상 높았던 반면 러시아 서부, 중앙아시아 북부, 유럽(북유럽 제외), 미국, 남아메리카의 기온은 평년보다 낮았음(그림 4).
- 같은 기간 동안 인도차이나반도, 필리핀, 남아메리카 북부 지역의 강수는 평년보다 많았음. 동아프리카에서 중국 서부에 이르는 지역, 유럽(남유럽 제외), 호주 북부, 적도 서태평양, 멕시코, 브라질 남부의 강수는 평년보다 적었음(그림 4).

해수면온도 전망

- 향후 3개월-5개월 사이의 ENSO 경보는 “라니냐 주의(La Niña WATCH)” 를 전망함(그림 5).
- 2020년 5월-7월 동안 적도 태평양의 해수면온도는 평년보다 낮을 것으로 전망되며 예측 후반부로 가면서 적도 태평양의 해수면온도는 평년보다 다소 낮은 상태를 유지할 것으로 예상됨. 다중모델앙상블 예측에 따르면 2022년 5월의 Niño3.4 지수는 -0.7°C 이었다가 서서히 증가하여 2022년 10월까지 약 -0.3°C 의 Niño3.4 지수가 유지될 것으로 전망됨(그림 6, 7).
- 2022년 5월-7월 동안 약 51%의 확률로 라니냐 상태가 나타날 것으로 전망되나 그 강도는 약할 것으로 예상됨. 그 후 라니냐 상태가 나타날 확률은 감소하고 ENSO 중립 상태가 나타날 확률은 서서히 증가하여 2022년 8월-10월까지 52% 이상의 확률로 중립 상태가 우세할 것으로 예상됨(그림 8).

기온 및 강수 전망

2022년 5월-7월 (그림 9)

- 태평양(알래스카만, 열대 중앙 및 동태평양, 남태평양 남부 제외), 동인도양, 뉴질랜드, 중국 서부, 중앙아시아 남부, 미국 서부, 멕시코만, 북서대서양, 남대서양 남부의 기온은 평년보다 높을 확률이 매우 클 것으로 전망됨. 북극, 유라시아(북유럽, 러시아 서부, 인도, 인도차이나반도 제외), 캐나다, 미국 동부, 호주 북부, 아프리카 북부 및 중부, 브라질 및 아르헨티나 남부의 기온은 평년보다 높을 확률이 다소 클 것으로 예상됨. 북유럽, 러시아 서부, 남극의 기온은 평년보다 높을 경향이 전망됨.
- 열대 중앙 및 동태평양 남부의 기온은 평년보다 낮을 확률이 매우 클 것으로 전망됨. 인도의 기온은 평년보다 낮을 확률이 다소 클 것으로 예상됨.
- 브라질 북부, 카리브해의 기온은 평년과 비슷할 확률이 다소 클 것으로 전망됨. 인도차

이나반도의 기온은 평년과 비슷할 경향이 예상됨.

- 동인도양, 호주, 인도네시아와 호주 사이의 해역, 남아메리카 북부의 강수는 평년보다 많을 확률이 다소 클 것으로 전망됨. 중국 및 몽골 동부 지역, 인도의 강수는 평년보다 많을 경향이 예상됨.
- 열대 중앙 태평양의 강수는 평년보다 적을 확률이 매우 클 것으로 전망됨. 중앙아시아 남부, 서인도양, 서아프리카 일부 지역, 남아메리카 남부의 강수는 평년보다 적을 확률이 다소 클 것으로 예상됨. 유럽(북유럽 제외), 미국의 강수는 평년보다 적을 경향이 예상됨.
- 북아프리카의 강수는 평년과 비슷할 경향이 전망됨.

2022년 8월-10월 (그림 10)

- 북극, 북태평양 북부, 아열대 남태평양, 인도네시아, 필리핀해, 동인도양, 벥골만, 아열대 대서양의 기온은 평년보다 높을 확률이 매우 클 것으로 전망됨. 유라시아(인도 제외), 북아메리카, 아르헨티나, 아프리카 북부 및 중부의 기온은 평년보다 높을 확률이 다소 클 것으로 예상됨.
- 남위 10° -20° 동태평양과 호주 남부의 기온은 평년보다 낮을 확률이 다소 클 것으로 전망됨.
- 동인도양, 인도네시아, 아열대 중앙 및 남태평양, 호주의 강수는 평년보다 많을 확률이 다소 클 것으로 전망됨. 북극의 강수는 평년보다 많을 경향이 전망됨.
- 남위 5° -15° 중앙 태평양과 서인도양 강수는 평년보다 적을 확률이 매우 클 것으로 전망됨. 중앙아시아 남부, 카리브해, 아르헨티나 남부의 강수는 평년보다 적을 경향이 예상됨.
- 북아프리카와 사우디아라비아의 강수는 평년과 비슷할 경향이 전망됨.

Sea Surface Temperature





그림 2. 2022년 3월 해수면온도 분포 및 평년대비 편차.

Sea Surface Temperature / Outgoing Longwave Radiation / U-wind at 850hPa



* Anomalies are averaged between 5°S and 5°N.

그림 3. 2020년 4월-2022년 3월 해수면온도, 상향장파복사, 850hPa 바람 평년대비 편차의 시간-경도 단면도(평년: 1991-2010).

Temperature at 2m



Outgoing Longwave Radiation




그림 4. 2022년 3월 기온(위) 및 상향장파복사(아래)의 평년대비 편차(평년: 1991-2010).




그림 5. 2022년 5월-10월 ENSO 경보(평년: 1991-2010).

* ENSO 경보 정보는 2022년 4월부터 관측 자료 업데이트 상황에 따라 최신의 경보 정보를 제공하기 위하여
매월 15일, 말일경에 업데이트 됩니다.




그림 6. 2022년 5월-10월 해수면온도 평년대비 편차(평년: 1991-2010).

Nino3.4 Index for 2022 MJJASO





그림 7. 2022년 5월-10월 평년대비 Niño3.4 지수 편차(평년: 1991-2010).


Probabilistic ENSO Forecast for 2022 MJJASO



* ENSO Intensity based on 3M Mean Niño3.4 SST Anomaly (Category Boundaries: +/-1.5, 1.0, 0.5°C)

그림 8. 2022년 5월-10월 ENSO 종류 및 강도 확률예측(평년: 1991-2010).

Temperature at 2m for May-July 2022



Precipitation for May-July 2022





그림 9. 2022년 5월-7월 기온(위)과 강수(아래)의 평년대비 편차(평년: 1991-2010).

Temperature at 2m for August-October 2022



Precipitation for August-October 2022




그림 10. 2022년 8월-10월 기온(위)과 강수(아래)의 평년대비 편차(평년: 1991-2010).

* 최근 기후 현황에 대한 자세한 정보는 아래에서 확인할 수 있습니다.

<http://www.apcc21.org/ser/high.do?lang=ko>

* 계절 예측 및 검증에 대한 자세한 정보는 아래에서 확인할 수 있습니다.

<http://www.apcc21.org/ser/outlook.do?lang=ko>

본 기후 전망은 매월 15일경 APEC 기후센터의 기후사업본부 예측운영과에서
작성·배포합니다.

기후 전망을 구독하시고 싶거나 질문이 있으시면 mme@apcc21.org로 연락 주시기 바랍니다.

APCC 계절예측은 전 세계 11개국 15개 기관으로부터 수집된 모델 결과를 종합한 것으로 각국 기상청의 예보와 다를 수 있으니 참고 자료로 활용해 주시기 바랍니다. 각 지역에 대한 공식 기후 전망은 각국 기상청의 발표를 참고해 주십시오.

감사의 글

APEC 기후센터는 아·태지역의 이상기후 감시 및 예측의 중추적 역할을 수행하기 위해 APEC 회원국 합의에 의해 2005년 부산에 설립되었습니다. APCC 기후센터는 전 세계 11개국 15개 기관의 기후예측 모델 자료를 수집하고, 모델 간 앙상블 기법을 통해 계통적 오차를 보정하여 고품질 기후정보를 제공하고 있습니다. 참여 기관으로는 호주 기상청(BOM), 캐나다 환경기후변화부(ECCC), 중국 기상청(BCC), 대만 기상청(CWB), 프랑스 기상청(METFR), 유럽-지중해 기후변화센터(CMCC), 일본 기상청(JMA), APEC 기후센터(APCC), 한국 기상청(KMA), 부산대학교(PNU), 러시아 기상청(HMC), 러시아 중앙지구물리연구소(MGO), 영국 기상청(UKMO), 미국 항공우주국(NASA), 미국 기상청(NCEP)이 있습니다.